


Name: _____

Date: _____

Kan



Across

5. Genelde alerji durumlarında periferik dolaşımda sayıları artan bir tür beyaz kan hücresi

7. Pıhtılaşmış kandan şekilli elemanlar ayrıldıktan sonra geri kalan sıvıdır.

11. Memelilerin önemli bir kan paraziti. Vektörü Ixodes cinsi kenelerdir. Zoonoz bir hastalıktır. Başta sığır olmak üzere koyun ve keçilerde yaygındır.

12. Genellikle köpeklerde görülen, keneye bulaşan bir kan paraziti. Klinik bulgularında burun kanaması, halsizlik, iştahsızlık peteşiyal kanamalar görülebilir.

13. En önemli fonksiyonu, özellikle patojen bakteriler olmak üzere fagositoz ve yabancı maddelerin yıkılmasındır. Yangı durumlarında sahaya ilk giden hücrelerdir

14. En büyük lökositlerdir.

15. Kanın şekilli elemanlarının sayıları ve bu hücrelerle ilgili detay bilgilerin elde edildiği sonuçlar çıktısıdır. (Tam kan sayımı)

17. Trombosit

Down

1. Granülosit sayısı en az olan hücrelerdir. Genellikle parazitizm ve aşırı duyarlılık durumlarında kanda artış gösterir.

2. Genellikle Hct değeri, hemoglobin konsantrasyonu ve/veya eritrositsayısının referans değerlerin üstüne çıkmasıyla belirlenir.

3. Pıhtılaşması antikoagülanlarla önlenmiş kandan şekilli elemanlar ayrıldıktan sonra geri kalan sıvı kısımdır.

4. Periferik dolaşımda lenfosit sayısının artmasıdır.

6. Vücutta eritrosit kitlesinde azalma olarak ifade edilir.

8. Eritrosit yıkılması veya kan kaybı nedeniyle gelişen anemilerdir. Anemi

9. Sığır, koyun ve keçilerde protozoonlar tarafından meydana getirilen yüksek ateş, şiddetli zayıflık, halsizlik, anemi ve sarılıkla karakterize bir hastalıktır. Marginale, centrale ve ovis türleri vardır.

10. Relatif polisiteminin bir sebebidir.

16. Alyuvarların içerdiği ortalama hemoglobin konsantrasyonunu yansıtır.