


Farmakoloji 101



Across

4. İlk geçiş etkisi, akciğer ve karaciğerde görülür.
7. uygulanan ilaç miktarı ile elde edilen plazma ilaç konsantrasyonu arasındaki oran
9. Dakikada ilaçtan temizlenen plazma hacmi.
11. İlaçların biyotransformasyonunda görev alan başlıca organ
12. İlaç uygulamasından sonra ulaşılan en yüksek plazma konsantrasyonu, maximum konsantrasyonu belirten kısaltma.
13. mikroorganizma, parazit ve patolojik oluşumlara karşı sağaltım yöntem ve araçları, örneğin antibiyotik.

14. İlaçın etkin maddesinin veya onun terapötik molekül kısmının farmasötik şekilden absorbe edilerek sistemik dolaşıma geçme ve böylece vücuttaki etki yerinde veya onu yansıtan biyolojik sıvılarda (genellikle serum veya plazmada) var olma hızı ve derecesi
15. Bir ilacın toksik etkilere yol açan konsantrasyonunun yararlı etkilere yol açan konsantrasyonuna oranı; indeks

Down

1. İlaçların genel dolaşıma ulaşmadan önce ilk temas ettiği organ ya da dokuda biyotransformasyon tepkimelerine maruz kalmaları ve çoğunlukla etki kaybına uğramaları; presistemik etkisi.
2. Aynı etken maddeyi aynı miktarda içeren fakat farklı imalatçılar tarafından farklı yardımcı madde ve farklı teknolojilerle hazırlanmış ve farklı ticari isimleri olan tıbbi ürünler; eşdeğer

3. Etkin madde veya maddeler açısından, bilimsel olarak kabul edilebilir, etkinlik, kalite ve güvenilirliğe sahip olduğu kanıtlanarak dünyada ilk defa oazara sunulmak üzere ruhsatlandırılmış veya pazarlama izni verilmiş ürün; tıbbi ürün
5. İki veya daha fazla ilacın vücutta aynı anda veya yakın aralıklarla bulunması nedeniyle ilaç meydana gelebilir
6. Aktif taşımada bir maddenin başka bir maddeye kenetlenmemişse, taşıyıcı aracılığıyla yapılan taşınması.
8. Bazı Collie köpeklerde duyarlılığı vardır. MSS'ne kolayca geçer, eflüks edilemez.
10. Parenteral yol ilaç uygulamalarından SC.